



Avertissements agricoles auvergne

Bulletin technique N° 8 du 22/08/95
Sup. n° 1

BETTERAVES

Maladies : Maintenir la protection.

MAIS

Pucerons : Pas d'évolution - A surveiller.
Charbon des inflorescences : Bien observer.

COLZA

Désherbage : Le point.

BETTERAVES

MALADIES

★ Situation

- Cercosporiose : En évolution modérée. La pression étant plus soutenue en parcelles irriguées.
- Oïdium : Stagnation.
- Rouille : Rare.
- Ramulariose : Quasi absente.

★ Préconisation

Visiter vos parcelles afin d'agir en fonction de l'évolution de la cercosporiose, notamment en tenant compte de la date de votre dernière intervention (délai supérieur à 30 jours).

Maintenir une bonne protection courant Septembre.

Employer un fongicide polyvalent et rémanent (consulter la fiche couleur publiée avec notre bulletin n° 6 du 30/06/95).

MAIS

PUCERONS

⊛ Situation

Les infestations demeurent faibles.

⊛ Préconisation

Maintenir une surveillance.

CHARBON DES INFLORESCENCES

Les premiers symptômes sont visibles en secteurs contaminés de l'Allier (épis et panicules).

N'hésitez pas à nous contacter en cas de détection de symptômes de cette maladie sur votre exploitation dès maintenant.

La fiche couleur jointe vous aidera à mieux identifier Elle fait aussi le point sur la biologie de cette grave maladie et les différentes méthodes de lutte disponibles.

COLZA

DESHERBAGE

Pas de nouveauté.

La réussite du désherbage conditionne la culture de Colza. Il doit être raisonné dès le semis car tout rattrapage en cours de végétation reste aléatoire. Quelques éléments essentiels sont à respecter.

- S'attacher à obtenir une bonne implantation, bien homogène, rapide permettant d'étouffer les mauvaises herbes.

- Avoir une bonne connaissance des principales adventices pouvant poser problème au niveau de chaque parcelle (voire portion de parcelle) afin d'adapter au mieux la meilleure stratégie qui le plus souvent sera un programme de désherbage en tenant compte des 4 ou 5 adventices les plus fréquentes.

PROGRAMMES DE DESHERBAGE DU COLZA

Pré-semis	Pré-levée Post-semis précoce	COMMENTAIRES
Tréflan 2,5 l/Ha	Butisan 1,5 l/Ha	Bon rapport qualité-prix
Tréflan 2,5 l/Ha	Novall 1,5 l/Ha	Bonne efficacité globale. Utiliser 1,8 à 2l/Ha pour obtenir une bonne efficacité en cas de forte infestation de capselle
Tréflan 2,5 l/Ha	Colzor 6 l /Ha (ou 5l /Ha en sols filtrants)	Plus efficace sur gaillet, coquelicot. La dose ne doit pas être inférieure à 5 l/Ha, sinon l'efficacité sur capselle et repousses de céréales sera insuffisante.
Tréflan 2,5 l/Ha + Devrinol 2,2 l/Ha		Envisageable en absence de capselle et présence de matricaire et géranium.
Devrinol 2,2 l/Ha	Butisan 1,5 l/Ha	Bonne efficacité sur capselle et géranium.